



GROS craving ?!

Quand on est sur le *craving*, on prendrait n'importe quoi. On s'est tous déjà retrouvé dans cet état, je crois. Trop défoncé pour regarder ce qu'il y a dans l'fond d'la bouteille, dans l'fond du *bang* ou dans l'fond d'une seringue. On est moins sélectif et prêt à prendre n'importe quoi. En ce qui concerne les fonds d'bouteille, disons que c'est moins grave d'avalier un *butch* que de se *shooter* avec des seringues usagées. Le phénomène reste le même, ça part tout d'un ostie de *craving*.

Tout l'monde sait qu'il y a des seringues souillées dehors dans les ruelles et parcs de Montréal. Dernièrement, on en

trouve peut-être moins, car certains consommateurs les ramassent et les accumulent. Non pas dans le but de les rapporter dans un programme d'échange de seringues, mais plutôt dans le but de les vendre à d'autres consommateurs pour qu'ils les *Wash*. Face à ce constat, deux questions se posent. Premièrement, pourquoi payer pour des flûtes usagées et risquer de contracter une ITSS, en plus de ne même pas être g'lé, quand tu peux trouver du dilau pour le même prix? Deuxièmement, la personne qui vend des seringues usagées à du monde, comment fait-elle pour être encore capable de se regarder dans l'miroir ?

C'est important d'utiliser des seringues neuves, car tu ne sais jamais qui s'est *shooté* avec avant que tu l'utilises. Quand on sait qu'une seule aiguille souillée est dangereuse, imagine le danger de 10. Même si tu n'utilises pas une vieille seringue, la *dope* que tu as récupérée avec tes *wash* a peut-être été en contact avec un ou plusieurs virus. Non seulement les hépatites A, B ou C et le VIH/SIDA, mais aussi tuberculose, streptocoque, méningocoque et plus encore. Si la seringue était par terre, dans'marde à travers les déchets, elle a peut-être eu le temps de développer des bactéries graves et très nocives pour ta santé. Pense aussi que tu ne sais pas tout ce que contenaient les dix seringues : *Dilaudid, Coke, Smack, Valium, PCP*, etc. Sans parler des liquides utilisés : eau sale, bière, alcool... Mélanger deux *downers* peut s'avérer fatal. Pense à ça!

Le mieux serait de ne pas faire de *wash*, mais dans la limite où on est trop sur le *craving* pis qu'on ne pense pas à ça, on suggère de le faire avec ses propres seringues seulement, ça diminue les risques de beaucoup. Tu peux t'équiper d'un bac que tu gardes avec toi pour tes flûtes, et ensuite les rapporter dans les sites fixes ou les endroits où tu te procures tes affaires. Dans la plupart des CLSC, ils donnent des seringues neuves gratuitement. Aussi les travailleurs de rue ont toujours un bac pour les seringues usagées, informe-toi pis fais attention à toi! ■



Le réseau Track / Survival

Étude sur les infections par le VIH et le virus de l'hépatite C et les comportements associés chez les UDI (Utilisateur(ric)e de Drogues par Injection)

BUT DE L'ÉTUDE : Mieux connaître les comportements qui font que les UDI sont à risque d'attraper ces virus afin de prévenir de nouvelles infections et développer des services pour les personnes déjà infectées

ÇA SE PASSE COMMENT ?

- Questionnaire et prélèvement de salive
- Rencontre d'environ 15 minutes
- Rémunération offerte
- Entrevue anonyme

Recrutement chaque semaine :

Cactus Montréal	Spectre de rue
Mercredi et vendredi de 20h à minuit	Vendredi 12h à 15h Samedi 11h à 14h

Pour participer, viens-nous voir ou
contacte Darlène au (514) 886-4382