

La syphilis

La syphilis est une infection

qui se transmet sexuellement. Lorsqu'elle n'est pas dépistée et traitée, elle occasionne des troubles neurologiques ou cardiaques chez la personne infectée. La bactérie entre dans le corps à travers des ouvertures (le vagin, la bouche, l'anus ou par des coupures / lésions sur la peau) qui sont en contact avec des lésions chez la personne infectée. Durant les premiers stades de l'infection, des lésions (appelées chancres et qui ressemble à un gros feu sauvage non douloureux) se forment parfois à la surface de la peau. Ces chancres sont hautement infectieux. En touchant un chancre avec nos doigts, on peut infecter une autre personne en touchant ses ouvertures (vagin, bouche, etc.) avec ce doigt. Le port du condom lors des relations orales-génitales, lors des pénétrations vaginales et lors des pénétrations anales constitue une excellente protection contre la syphilis. Cependant, il y a un risque d'attraper la syphilis si le condom n'est pas utilisé pour les relations orales-génitales (« fellation et cunnilingus ») ou encore s'il y a frottement des organes génitaux sur les chancres (donc, le condom ne protégera pas si le chancre ne se trouve pas sur le pénis). On ne peut pas attraper la syphilis à travers des contacts avec des bols de toilette, des poignées de portes, dans les piscines, ou encore en partageant des vêtements. Finalement, le fait d'avoir déjà eu la syphilis ne va pas t'immuniser, tu dois toujours être vigilant.

En voyage

garde en mémoire que la syphilis est plus commune dans certains pays et que les condoms achetés à l'étranger peuvent être de qualité inférieure.

Depuis

maintenant cinq ans, une épidémie touche la population des hommes gais et bisexuels au Québec et, depuis deux ans, plus particulièrement les hommes de Montréal. Au rythme actuel, les experts estiment qu'entre 300 et 400 cas d'infections pourraient être déclarés à Montréal en 2006.

On a 2 à 5 fois

plus de chances de contracter le VIH lorsqu'on est infecté par la syphilis. Bien que la syphilis et le VIH se transmettent de façon similaire, il existe une différence importante entre ces deux infections. En effet, en prenant des antibiotiques, on peut se débarrasser complètement de la syphilis, alors que les traitements antirétroviraux ne font qu'améliorer la santé, sans guérir, des personnes vivant avec le VIH et le sida.

Si tu es

un homme qui a des relations sexuelles avec des hommes, il est recommandé de te faire tester régulièrement (prise de sang pour la syphilis) afin que toi et tes partenaires sexuels soient traités le plus rapidement possible et ainsi stopper l'épidémie. ■